PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO CATÉTERES VASCULARES

	Apósito		Cambio equipos ¹	Lavado y sellado	Retirada	
Catéter venoso periférico	Apósito de gasa c/48 h	O si precisa	c/ 4 días ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar permeabilidad. 2. 10 ml de SF monodosis mediante técnica push-stop-push y con presión positiva al clampar, para el mantenimiento. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consenso con médico responsable. 2. Ante existencia de flebitis grado ≥ 2. 3. Ante cualquier signo de infección local (enrojecimiento punto de punción, calor, pus) y/o fiebre. 4. Registrar retirada.
	Semipermeable c/7 días					
Catéter venoso central (CVC) < 30 días CVC >30 días	Gasa c/48 h	O si precisa	c/ 4 días ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar permeabilidad. 2. 10 ml de SF monodosis mediante técnica push-stop-push y con presión positiva al clampar en el uso intermitente del catéter. 3. Si catéter en desuso ($\geq 24h$), 3 ml fibrilín c/7 días. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consenso con médico responsable. 2. Ante existencia de flebitis grado ≥ 2. 3. Ante cualquier signo de infección local (enrojecimiento punto de punción, calor, pus) y/o fiebre. 4. Cultivo punta del catéter por prescripción del médico responsable. 5. Registrar retirada.
	Transparente/7 días					
Puerto implantable	Apósito de gasa, c/48 h	O si precisa	c/ 4 días ² Aguja gripper c/ 7 días	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar permeabilidad. 2. 10 ml de SF monodosis mediante técnica push-stop-push y con presión positiva al clampar. 3. Si catéter en desuso ($\geq 24h$). 4. 5 ml fibrilín c/6 semanas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consenso con médico responsable. 2. Ante existencia de flebitis grado ≥ 2. 3. Ante cualquier signo de infección local (enrojecimiento punto de punción, calor, pus) y/o fiebre. 4. Cultivo punta del catéter. 5. Registrar retirada. 	
	Semipermeable c/7 días					

1. El cambio de equipos comprende: equipos de sueroterapia, alargaderas, tapones y llaves de tres pasos, si existieran.

2. Cambiar equipos: a) En soluciones lipídicas o drogas vasoactivas, c/24 h. b) Si sangre o hemoderivados, c/ 4h. c) Si equipos visiblemente sucios. d) En perfusión propofol , c/12 h.

- Cura de CVC y puerto implantable con técnica estéril.
- Higiene de manos antes y después de cualquier manipulación del catéter.
- Minimizar manipulación de catéteres, usar siempre guantes limpios.
- Preguntarse diariamente sobre la necesidad del catéter y retirar cualquier catéter que no sea absolutamente imprescindible.
- Evitar sueros de mantenimiento sin prescripción.
- Desinfectar dosifix previo a cada uso.
- Cambiar tapones tras cada uso.