

# Què saber sobre el Catèter Central d'Inserció Perifèrica? (PICC)

**CURA:** Setmanalment (o quan precisi)

## CANVI D' EQUIP:

- Infusió contínua: 4 dies
- Infusió intermitent: 24h
- Nutrició parenteral: 24h
- Propulsió: 12h
- Hemoderivats: 2 A (o màx. 4h)

## 20 ml RENTAT AMB TÈCNICA PUSH-STOP-PUSH

- Abans i després de cada administració.
- Amb xeringues de 10ml o més.
- Quan hi hagi reflux de sang.
- Setmanal si no està en ús.

## MEDIAL:

-Nutrició parenteral (llum única).  
Si no hi ha NPT es pot utilitzar per a altres medicaments o sedo-analgèsia.

## DISTAL:

- Es poden administrar grans quantitats de líquids com fluids viscosos, coloides, hemoderivats o altres medicaments.
- Mesurament de la Pressió Venosa Central (PCV)

## NETEJA DEL BIOCONNECTOR AMB CLORHEXIDINA ABANS DEL SEU ÚS

- Utilitzar bioconnectors per a medicacions intermitents o bolus.
- No utilitzar bioconnectors en perfusions contínues.
- Treure claus de tres passos o bioconnectors innecessaris.
- Els taps de clorhexidina no substitueixen la desinfecció de la llum abans de cada ús.



## PROXIMAL:

- Amine (soles), medicaments, extracció sanguínia, transfusions.

## CURA AMB TÈCNICA ESTÈRIL DEIXANT VISIBLE EL PUNT D'INSERCIÓ

- Pany, guants i gases estèrils.
- Mascareta
- Apòsit estèril gran transparent per vigilar el punt d'inserció.
- Sistema de fixació
- Clorhexidina.

**SEMPRE HIGIENE DE MANS!**



# ¿Qué saber sobre el Catéter Central de Inserción Periférica? (PICC)

**CURA:** Semanalmente (o cuando precise)

## CAMBIO DE EQUIPO:

- Infusión continua: 4 días
- Infusión intermitente: 24h
- Nutrición parenteral: 24h
- Propofol: 12h
- Hemoderivados: 2 U (o máx. 4h)

## 20 ml LAVADO CON TÉCNICA PUSH-STOP-PUSH

- Antes y después de cada administración.
- Con jeringas de 10ml o más.
- Cuando haya reflujo de sangre.
- Semanal si no está en uso.

## MEDIAL:

-Nutrición parenteral (luz única).  
Si no hay NPT se puede utilizar para otros medicamentos o sedo-analgesia.

## DISTAL:

- Se pueden administrar grandes cantidades de líquidos como fluidos viscosos, coloides, hemoderivados u otros medicamentos.
- Medición de la Presión Venosa Central (PCV)

## LIMPIEZA DEL BIOCONECTOR CON CLORHEXIDINA ANTES DE SU USO

- Utilizar bioconectores para medicaciones intermitentes o bolos.
- No utilizar bioconectores en perfusiones continuas.
- Quitar llaves de tres pasos o bioconectores innecesarios.
- Los tapones de clorhexidina no sustituyen la desinfección de la luz antes de cada uso.

## PROXIMAL:

- Aminas (solas), medicamentos, extracción sanguínea, transfusiones.

## CURA CON TÉCNICA ESTÉRIL DEJANDO VISIBLE EL PUNTO DE INSERCIÓN

- Paño, guantes y gasas estériles.
- Mascarilla
- Apósito estéril grande transparente para vigilar el punto de inserción.
- Sistema de fijación
- Clorhexidina.

**¡SIEMPRE HIGIENE DE MANOS!**

